
ATALANTA, Bd. IX, Heft 4, Dezember 1978, Würzburg

Issoria lathonia (LINNÉ, 1758) – BINNENWANDERER 1. Ordnung

Die Meldungen sind im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. Es konnten insgesamt nur 82 Imagines in Mitteleuropa beobachtet werden; 80 % dieser Beobachtungen stammen aus Bayern. Die restlichen Meldungen teilen sich auf den Süden der DDR (225, 293, 295), auf Rheinland-Pfalz (1, 452, 670) und auf die Umgebung von Offenbach (598) auf. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr konnten nördlich der deutschen Mittelgebirge nur fünf Falter aus der Umgebung von Hannover (3175 Leiferde und 3006 Großburgwedel) beobachtet werden (152).

Lycaenidae

von

HARTMUT STEINIGER und ULF EITSCHBERGER

Syntarucus pirithous (LINNÉ, 1767) – BINNENWANDERER 2. Ordnung

Es liegt nur eine Meldung von 14 Imagines aus Rovinj (Istrien) vom 14.X. vor (310).

Lampides boeticus (LINNÉ, 1767) – BINNENWANDERER 2. Ordnung

L. boeticus konnte von vier unserer deutschen Mitarbeiter in Dalmatien (274, 379) und in Süd-Frankreich (243, 755) nachgewiesen werden.

Everes argiades (PALLAS, 1771) – BINNENWANDERER 1. Ordnung

Die anscheinend immer seltener werdende Lycaenide konnte 1977 in Mitteleuropa nur in 7811 Ihringen am Kaiserstuhl (755) mit einem ♂ am 26.VI. nachgewiesen werden. Weitere Nachweise liegen noch aus F-64500 St-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) (243) und aus F-04320 Villevieille (Alpes-de-Haute-Provence) (755) vor.

Lycaena phlaeas (LINNÉ, 1761) – BINNENWANDERER 1. Ordnung

Im Vergleich zu 1976 sind die Populationen 1977 etwa auf ein Fünftel der Individuenstärke zusammengeschrumpft. So konnten in Deutschland an 61 Orten nur 342 Falter beobachtet werden. Die meisten Beobachtungen stammen hierbei aus der Umgebung von Gifhorn/Wolfsburg, aus der Eifel und aus Nordost-Bayern. Einzelmeldungen (20 Imagines) liegen noch aus Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, Jugoslawien, der DDR und aus Sardinien vor.